



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale

di Novara  
P.IVA01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100

Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

**(\*) n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati Archiflow**

**Prot. del 26/06/2024**

**Oggetto: caso di pertosse**

Gentili Genitori,

Nella sezione Farfalle della Scuola Materna Guido da Biandrate si è verificato un caso di pertosse.

La pertosse è una infezione respiratoria acuta altamente contagiosa, causata dal batterio *Bordetella pertussis* che provoca infezioni alle vie respiratorie che possono verificarsi a qualsiasi età e che possono essere inapparenti, ma anche estremamente gravi, specie quando il paziente è un neonato o un lattante.

La pertosse si caratterizza per una tosse persistente (per più di tre settimane). L'esordio della malattia si manifesta con una tosse lieve, accompagnata da febbre e copiose secrezioni nasali. Nella progressione dell'infezione la tosse diventa parossistica e si associa a difficoltà respiratorie che possono durare più di 2 mesi in assenza di trattamento. Segue poi una fase di convalescenza.

In seguito a tosse parossistica si possono verificare anche casi di apnea, cianosi e vomito.

Il periodo d'incubazione è di circa 7-10 giorni (massimo 3 settimane). Il contagio avviene per via aerea attraverso le goccioline di saliva diffuse nell'aria quando il malato tossisce.

Un adeguato trattamento antibiotico permette la guarigione in circa 2 settimane.

In Piemonte, l'incidenza delle segnalazioni di pertosse ha subito un significativo incremento da marzo 2024. L'incidenza più alta si registra nei bambini di età inferiore ai tre anni, a maggior rischio di forme gravi di malattia.

**Si invitano pertanto tutti i genitori a monitorare nelle prossime settimane l'eventuale comparsa di sintomi respiratori e in caso segnalare al più presto al Medico Curante – Pediatra, per l'eventuale terapia antibiotica.**

**In caso di soggetti a maggior rischio di contrarre forme gravi di infezione, come bambini di età inferiore a 3 anni o con patologie che riducono le difese immunitarie, si consiglia di rivolgersi al pediatra per valutare la terapia antibiotica post-esposizione anche in assenza di sintomi.**

Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE MEDICO  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott.ssa Stefania Rametta**



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)